OPSITE◇ FLEXIGRID◇

Una medicazione ad elevata permeabilità al vapore acqueo[1,2] che può aiutare a ridurre al minimo il rischio di infezione[3-6].

La medicazione trasparente in film con barriera batterica[3-6] può rimanere in sede fino a 7 giorni[7-9].



Smith+Nephew

OPSITE◇ FLEXIGRID◇
Pellicola trasparente in rotolo

Aiuta a **RIDURRE A ZERO◇**
l'impatto clinico ed economico delle ferite
smith-nephew.com

OPSITE◊ FLEXIGRID

Medicazione trasparente in film costituita da un film in poliuretano con adesivo acrilico.

OPSITE FLEXIGRID aiuta a ridurre il rischio di infezione secondaria poiché contribuisce a prevenire la contaminazione batterica della ferita fornendo una barriera contro i batteri.[3-6]

Caratteristiche e benefici

Film a basso attrito

OPSITE FLEXIGRID è un film a basso attrito. L'attrito e le forze di taglio contribuiscono al danno tissutale. Questo può causare la formazione di vesciche, lesioni superficiali dei tessuti e ulcere da pressione.[10-12]

Riduce al minimo l'esposizione al rischio di infezione

OPSITE FLEXIGRID mantiene la propria integrità durante il periodo di utilizzo, garantendo il fissaggio sicuro delle medicazioni primarie e contribuendo a ridurre il rischio di infezione associato al sollevamento della medicazione dalla superficie della ferita.[7-9,13]

Tempo di permanenza fino a 7 giorni

L'elevata adesività iniziale[14,15] di OPSITE FLEXIGRID consente di lasciare la medicazione in sede fino a 7 giorni. Ciò può tradursi in un minor numero di cambi di medicazione, assicurando una protezione continua delle ferite post-operatorie, degli innesti cutanei e dei siti donatori.[7-9,13]

Facilità d'uso

OPSITE FLEXIGRID è trasparente e facile da applicare.[8,9,13,16] L'esclusiva griglia di misurazione della ferita presente su OPSITE FLEXIGRID consente un posizionamento accurato e può essere utilizzata come strumento di mappatura della ferita.

Impermeabile

OPSITE FLEXIGRID è impermeabile e consente ai pazienti di fare la doccia mantenendo la medicazione in sede.[1,9,15]

Conformabile

OPSITE FLEXIGRID è conformabile ed estensibile. Questa caratteristica consente alla medicazione di adattarsi alle aree difficili da medicare.[1,14-16]

Tasso di trasmissione del vapore acqueo (MVTR)

OPSITE FLEXIGRID è una medicazione permeabile al vapore acqueo che contribuisce a prevenire la contaminazione batterica della ferita. La permeabilità al vapore acqueo consente all'umidità in eccesso di evaporare attraverso la medicazione, mantenendo al contempo un ambiente umido favorevole alla gestione della ferita, contribuendo a ridurre il rischio di macerazione cutanea.[1-6]

Indicazioni

OPSITE FLEXIGRID è indicato per:

- La gestione delle ferite superficiali (ad es. ustioni minori, scottature, abrasioni, lacerazioni e ulcere della gamba nella fase finale di guarigione).
- La protezione della cute dall'attrito e dalla contaminazione esterna.
- Per la prevenzione delle lesioni da pressione. Il fissaggio di medicazioni primarie, ad es. INTRASITE◊ GEL e ALLEVYN◊ NON-ADHESIVE.
- Il fissaggio di cateteri.
- La protezione della cute intorno agli stomi e sotto le sacche di drenaggio per la gamba.
- La medicazione di ferite post-operatorie, innesti cutanei e siti donatori.

Per informazioni dettagliate sul prodotto, incluse le indicazioni d'uso, le controindicazioni, le precauzioni e le avvertenze, consultare le Istruzioni per l'Uso (IFU) applicabili al prodotto prima dell'utilizzo.

Codice d'ordine OPSITE FLEXIGRID

Dimensioni	Codice	Pezzi per scatola
6cm x 7cm	4628	100
10cm x 12cm	4630	50
12cm x 12cm	66004964	10
12cm x 25cm	4632	20
15cm x 20cm	4631	10

Advanced Wound Management
Smith & Nephew S.r.l.
Viale T. Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
T. +39 039 60941
F. +39 039 651535
www.smith-nephew.com/italia
www.smith-nephew.com/education

◊ Marchio di Smith+Nephew
Tutti marchi registrati e riconosciuti
Riservato al personale sanitario
©Maggio 2020 Smith+Nephew
AWM-AWC-51754- it | GMC1073

Referenze
1. Smith + Nephew Wound Management. 2012. OPSITE FLEXIGRID Dressing Physical Properties. DS/12/214/DOF. **2.** Ciortea LI, Imhof RE. *Effects of wound dressings on skin properties. J Optoelectron Adv M.* 2005;7(6):2925-2929. **3.** Demirtas Y, Yagmur C, Soylemez F, Ozturk N, Demir A. *Management of split-thickness skin graft donor site: A prospective clinical trial for comparison of five different dressing materials. Burns.* 2010;36(7):999-1005. **4.** Smith + Nephew 2004. Internal bacterial barrier testing WRP-TW042-399. **5.** Smith + Nephew 2008. Internal report TSG 018-07-008 v2. **6.** Vejdan SA, Khosravi M, Zojaji F. *Burn donor site dressing using Melolin and FLEXIGRID versus conventional dressing. Shiraz E-Medical Journal.* 2015;16(1). **7.** L'Ecuchli S, Hafner J, Ostheeren S, *et al. Management of split-thickness skin graft donor sites: A randomized controlled trial of calcium alginate versus polyurethane film dressing. Dermatology.* 2014;227(4):361-366. **8.** VTSR/HVT024_ST666 Volunteer Trial Critical Data Report. Issue 2. 2007. **9.** VTSR/HVT037 Volunteer Trial Report Vol 1. 2008. **10.** Smith + Nephew 2008. Friction testing of various film products DS/08/035/RI. **11.** Smith + Nephew. 2019. Friction Testing - OPSITE FLEXIFIX, OPSITE FLEXIGRID and ALLEVYN LIFE. DS/19/263/R. **12.** PUP pressure shear friction and microclimate in context. International Review. A consensus document. London Wounds International 2010. **13.** 42-DRM-PAD-07-002/ HVT030 Volunteer Trial Clinical Study Report. Vol 1. Version 7. 2007. **14.** Smith + Nephew 2004. Prospective user evaluation on the effect of process changes to the manufacture of OPSITE FLEXIGRID wound dressings (CE/010/OFG). **15.** Blackburn I. Technical justification summary - OPSITE FLEXIGRID 006. 2008. **16.** Smith + Nephew 1990. A community based clinical evaluation of standard OPSITE Film Dressing compared with a new presentation OPSITE Film Dressing (CTR 88/11).