Un idrogel per favorire lo sbrigliamento autolitico[1-7]

INTRASITE◊ GEL permette all'idrogel di reidratare il tessuto necrotico[1-3,5,8]

Smith+Nephew

INTRASITE◊ GEL

Medicazione a idrogel

www.smith-nephew.com



INTRASITE◊ GEL è un idrogel trasparente progettato per favorire lo sbrigliamento attraverso autolisi, reidratando il tessuto necrotico.[1-8]

INTRASITE◊ GEL aggiunge umidità al tessuto necrotico, stimolando così gli enzimi naturali a degradare il tessuto morto.[1,3,5,8]

Caratteristiche e benefici

Guarigione in ambiente umido

INTRASITE GEL favorisce il processo di guarigione creando un ambiente umido per la lesione. L'ambiente umido generato da INTRASITE GEL facilita la riepitelizzazione, promuove la formazione di tessuto di granulazione e contribuisce alla gestione della ferita.*[1,2,8-10]

Favorisce lo sbrigliamento autolitico

INTRASITE GEL offre un'azione delicata ed efficace di sbrigliamento e rimozione del tessuto necrotico. INTRASITE GEL Idrogel per Ferite promuove lo sbrigliamento autolitico reidratando il tessuto necrotico e assorbendo l'essudato in eccesso.*[1-3,5,8,11]

Proprietà batteriostatiche

INTRASITE GEL possiede proprietà batteriostatiche che possono contribuire a proteggere la lesione dalla contaminazione esterna e dal rischio di infezione.[12]

Comodità per il paziente

INTRASITE GEL è comodo per il paziente contribuendo a ridurre il dolore.†[11,12]

Effetto rinfrescante

INTRASITE GEL lenisce all'applicazione e durante l'uso, contribuendo a ridurre il dolore per il paziente.[11,13,15]

Indicazioni

INTRASITE GEL è indicato per la rimozione di tessuto non vitale da ferite superficiali, con sottominatura o profonde:


- Piaghe da decubito
- Ulcere del piede diabetico
- Ferite maligne
- Ustioni
- Ferite chirurgiche
- Scottature
- Lacerazioni
- Abrasioni
- Amputazioni
- Ulcere fungine

Indicato anche per il trattamento di ferite cavitarie in fase di granulazione, cute escoriata e ustioni da radioterapia.



INTRASITE GEL

S+N Codice	Formato	Scatola
7308	8g	10
7311	15g	10
7313	25g	10



Advanced Wound Management
Smith & Nephew S.r.l.
Viale T. Edison, 110
20099 Sesto San Giovanni (MI)
T. +39 039 60941
F. +39 039 651535

www.smith-nephew.com

◊Marchio di Smith+Nephew
Tutti marchi registrati e riconosciuti
©Luglio 2026 Smith+Nephew
AWM-AWC-51753-it| GMC1454
Riservato al personale sanitario

Per informazioni dettagliate sul prodotto, comprese le indicazioni d'uso, le controindicazioni, le precauzioni e le avvertenze, consultare le relative Istruzioni per l'Uso (IFU) prima dell'utilizzo.

Referenze: 1. Colin D, Kurring Pa, Yvon C. Managing sloughy pressure sores. *J Wound Care*. 1996;5(10):444–446. **2.** Cassino R, Ricci E, Carusone A. A conformable hydrogel in the debridement of complex necrotic wounds. Paper presented at: EWMA; 1997; Milan. **3.** Smith+Nephew 2020. Use of literature and data to support the INTRASITE Mode of Action. Internal report. EO.AWM. PCSgen.004.v2. **4.** Thomas S, Fear M. The effi cacy of INTRASITE Gel as a debrider of non-viable tissue from wounds treated in the community. Paper presented at: EWMA; 1993; Harrogate, UK. **5.** Flanagan M. The effi cacy of a hydrogel in the treatment of wounds with non-viable tissue. *J Wound Care*. 1995;4(6):264–7. **6.** Thomas S, Fear M. Comparing two dressings for wound debridement. *Journal of Wound Care*. 1993;2(5):272–274. **7.** Williams C. Intrasite Gel: a hydrogel dressing. *British journal of nursing* (Mark Allen Publishing). 1994;3(16):843–846. **8.** Smith+Nephew 2011. Physical and chemical properties of INTRASITE Gel APPLIPAK. Internal report. DS/11/008/R4. **9.** Smith+Nephew 2019. Use of benchtop test data to support product claims for hydrogels referring to moist wound healing. Internal statement. EO.AWM.PCSgen.002.v3. **10.** Thomas S, Hay NP. *In vitro* investigations of a new hydrogel dressing. *Journal of Wound Care*. 1996;5(3):130–131. **11.** Bale S, Banks V, Haglestein S, Harding KG. A comparison of two amorphous hydrogels in the debridement of pressure sores. *Journal of Wound Care*. 1998;7(2):65–68. **12.** Smith + Nephew 1996. An investigation into the eff ects of INTRASITE Gel on the *in vitro* proliferation of aerobic and anaerobic bacteria. Internal report. SR/Y001/BS104. **13.** Smith+Nephew. A Pilot Study Comparing INTRASITE GEL with Saline Soaked Gauze for Debridement. Internal report. CTR90/08. **14.** Smith+Nephew 2020. Use of technical and clinical evidence to support "cooling" eff ect of INTRASITE. Internal report. EO.AWM.PCS0017.001.v1. **15.** De Vincentiis G, Caracciolo G, Anselmi A. INTRASITE Gel in the management of deep second and third degree burns in children. Paper presented at: EWMA; 1996.